EXERCICE N°1 : 40'

1) Calculer les primitives des fonctions suivantes : $f(x) = 5x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 1$; $f(x) = 2x + 1 - \frac{2}{x^2}$; $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3}$; $f(x) = \frac{x^4 - 2x^2 + 3}{x^2}$; $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-2x+4}}$; $f(x) = (2x-1)(2x^2 - 2x)^4$; $f(x) = \frac{x+3}{(x+1)^3}$; $f(x) = \sqrt{2x+3}$; $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{(x-1)^2}$; $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^3}$; $f(x) = \frac{x^4}{(\sqrt[4]{x^5}+1)^3}$; $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x \cdot tg^3 x}$; $f(x) = \frac{\cos x}{1 - \cos 2x}$; $f(x) = tg\,x + tg^3 x$; $f(x) = \sin^5 x - \cos^4 x$; $f(x) = \frac{1}{x^2}\sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

2) Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = x + \sqrt{x^2+1}$. Exprimer $\sqrt{x^2+1}$ à l'aide de u(x) et u'(x).

En déduire des primitives pour les fonctions : $f(x) = \frac{1}{\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\sqrt{x^2+1}}$ et $g(x) = \frac{\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)^2}{\sqrt{x^2+1}}$.

EXERCICE N°2 : 15' 3 points

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}$. Soit F la primitive de f sur $]1, +\infty[$ qui s'annule en $\sqrt{2}$.

1) Montrer que F est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$. En déduire le signe de F(x) sur $]1, +\infty[$.

2) Soit G la fonction définie sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ par $G(x) = F\left(\frac{1}{\sin x}\right)$.

a) Montrer que G est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et déterminer sa fonction dérivée.

b) En déduire que pour tout x de $]0, \frac{\pi}{2}[$, $G(x) = x - \frac{\pi}{4}$. Calculer alors F(2).

EXERCICE N°3 : 15' 3 points

Soit f la fonction définie sur $[0, \pi]$ par $f(x) = \sqrt{1+\cos x}$. **1) a)** Mq f est une bijection de $[0, \pi]$ sur $[0, \sqrt{2}]$.

b) Montrer que la fonction f^{-1} est dérivable sur $[0, \sqrt{2}[$ et expliciter sa fonction dérivée.

2) Soit la fonction g définie sur $]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[$ par $g(x) = \frac{2}{\sqrt{2-x^2}}$. On note G sa primitive qui s'annule en 0.

a) Mq G est impaire. **b)** Montrer que pour tout x de $[0, \sqrt{2}[$, $G(x) = \pi - f^{-1}(x)$. En déduire G(1).

EXERCICE N°4 : 15' 3 points

Soit f la fonction définie sur $[-2,2]$ par $f(x) = \sqrt{4-x^2}$.

1) a) Montrer que f admet au moins une primitive sur $[-2,2]$.

b) Soit F la primitive de f sur $[-2,2]$ qui s'annule en 0. Etudier la parité de F.

2) Soit G la fonction définie sur $[0, \pi]$, par $G(x) = F(2\cos x)$ et ζ_G sa courbe représentative.

a) Montrer que le point $I(\pi/2, 0)$ est un centre de symétrie de ζ_G.

b) Montrer que pour tout x de $[0, \pi]$, $G(x) = \pi - 2x + \sin(2x)$. En déduire F(1), F(2) et $F(\sqrt{2})$.

Oarray.tn - Agra Blech - Oarray.tn